



Código: IEQ_9.1.6 FZYE 09	Página 1 de 5
Fecha de Emisión: 28/03/2011	Fecha de Revisión: 31/01/2016
	Nº de Revisión: 04
Elaboró:	COMISIÓN MIXTA
Aprobó:	SECRETARÍA ADMINISTRATIVA

Puntos a Seguir Para Un Manejo De Las Vísceras



DIRECTORIO INSTITUCIONAL

M.C. JESÚS ENRIQUE SEÁÑEZ SÁENZ
Rector

DR. JESÚS VILLALOBOS JIÓN
Secretario General

M.C. JAVIER MARTÍNEZ NEVÁREZ
Director Académico

Ph.D. ALMA DELIA ALARCON ROJO
Director de Investigación y Posgrado

MTRO. JESÚS ENRIQUE PALLARES RONQUILLO
Director de Extensión y Difusión Cultural

M.A.R.H. NORMA CECILIA GONZÁLEZ MARTÍNEZ
Director Administrativo

DR. ROSENDO MARIO MALDONADO ESTRADA
Director de Planeación y Desarrollo Institucional

DIRECTORIO DE LA FACULTAD

M.A. LUIS RAÚL ESCARCÉGA PRECIADO
Director

M.C. ANTONIO HUMBERTO CHÁVEZ SILVA
Secretario de Investigación y Posgrado

M.C. RICARDO ABEL SOTO CRUZ
Secretario Académico

D.P.h. EUGENIO CÉSAR QUINTANA MARTÍNEZ
Secretario de Extensión y Difusión

M.C. JOSÉ ROBERTO ESPINOZA PRIETO
Secretario Administrativo

M.A.P. DIANA GONZÁLEZ LÓPEZ
Secretario de Planeación

MANEJO DE VÍSCERA DE LA FACULTAD DE ZOOTECNIA Y ECOLOGÍA. (Elaborado por Ricardo Zamudio).

- El trabajador encargado de la manipulación de las vísceras o subproductos destinados al relleno sanitario deberá contar con guantes y tapabocas para realizar el traslado.
- Avisar que se generaran vísceras un día antes o si no al momento de que se confirme que habrá sacrificio de algún animal. (Avisar a la secretaria de las unidades en caso de no localizar al encargado del traslado).
- Contar con un mínimo de tres bandejas para depósito de vísceras y que estén debidamente señaladas.
- No meter en bolsas de plástico la víscera.
- No juntar vísceras (orgánico) con basura inorgánica en los tambos de 200 litros.




Figura 1. Manejo correcto e incorrecto de la basura orgánica e inorgánica.

- En cuanto se retiren las bandejas, se deberá lavar el área de depósito de las bandejas.



Figura 2. Depósito correcto e incorrecto de víscera en bandeja.

- En caso de que la víscera rebase la capacidad de las bandejas, se procederá a usar un tambo de 200 litros que este vacío y se le informara de inmediato al encargado del traslado de la víscera.




Figura 3. Depósito de víscera correcto e incorrecto en tambo.

- Cuando sea poca o muy poca cantidad de víscera depositarla en las bandejas y de ningún modo depositarla en los tambos de 200 litros destinados para la basura inorgánica.
- **Si los estudiantes o algún maestro trabajara o realizara alguna práctica, avisarles sobre el manejo y el reglamento del depósito de vísceras.**
- En caso de que la víscera exceda la capacidad de los recipientes, inmediatamente contactar al encargado del traslado o en su caso a la comisión de higiene y seguridad.
- Si se generara vísceras los viernes o un día antes de algún día festivo o en su caso vacaciones comunicarlo por lo menos 3 horas antes al encargado del manejo de víscera o a la secretaria de las unidades.
- Dejar las bandejas arriba de la rampa cuando se deposite la víscera y los tambos de 200 litros debajo de la rampa, siempre y cuando no se llenen de víscera. En caso de que se llene un tambor de 200 litros con víscera dejarlo arriba de la rampa para mejor manipulación al subir la bandeja al automóvil.




Figura 4. Posición correcta e incorrecta de la bandeja de víscera en la rampa.