

REPORTE DE PRÁCTICA

El día domingo 8 de Marzo, se realizó una práctica en el rancho de Teseachic, localizado en el municipio de Namiquipa donde el propósito de la práctica fue de saber el estado del ganado que va a exportación.

Los puntos importantes era conocer el número de animales ciegos, con abscesos, papilomas y garrapatas, otra práctica que se realizo fue la castración y descorne.

A los animales ciegos se les aplicaron gotas oftálmicas, a los que traían garrapatas se les aplico un garrapaticida, se les revisaron papilomas y se les quitaron con una manguera, porque de esta manera es más sencillo y solo llega a la raíz del papiloma, se nos explicó que también se pueden extraer con navaja, pero hay más riesgo de que se lastime al animal.



1. Se revisaron 16 becerros.
2. Se curó 1 becerro ciego.
3. Se aplicó solución para garrapatas a todos
4. Se trataron 8 becerros con papilomas.
5. Se vieron solo algunos con tatuaje en las orejas.

6. No se encontraron becerros con abscesos, esta revisión se hizo mediante la palpación del cuello, que es la parte del animal donde se encuentra este problema



Prácticas:

Descorne: Se realizó a la mayoría, 11 becerros.

- Castración: Se realizó a 23 becerros.

Curación de ciegos: Esta práctica se realiza colocando a los becerros en una trampa y se les supervisaban los ojos, y a los que se le observaba como una nube se les aplicaba un polvo óptico de color morado llamado Sulfamixin para su curación.

Garrapatas: A todos los animales una vez en la trampa, se les aplicaba un garrapaticida llamado Bolfo es un aerosol, y se les aplicaba dentro de las orejas.

Papilomas: Se supervisaba que los animales que entraban a la trampa no trajeran papilomas principalmente en la parte frontal de la cabeza, a los que se les observaba se les extraían con manguera – poliducto, o con la navaja.



Tatuajes: Se supervisaba que los animales trajeran tatuaje en la oreja para su identificación.



Abscesos: Cuando los animales son colocados en la trampa, se le supervisa que no tengan bolas (abscesos) en la parte del cuello de los becerros.

Descorne: Una vez los animales colocados en la trampa y como ultima práctica, se descornaban los animales con las pinzas descornadoras, había animales que traían los cuernos más largos que otros, al colocar las pinzas sobre la base del cuerno, las pinzas se abren con fuerza y lo más rápido posible para que de esa manera se corten desde la base, al término de esto se les aplica una solución en aerosol llamada Tetrabac antibiótico de color azul y previene infecciones.



Castración: Para la realización de esta práctica, una vez seleccionados los becerros, son colocados en una trampa que se inclina, una vez inclinado el animal se procede a hacer la castración, el primer paso es tomar el escroto y con una navaja o bisturí cortarlo, y externamente presionar para que salgan los testículos y queden expuestos para su extracción, una vez localizados se hacen movimientos rápidos presionando los conductos para de esta manera liberarlos de grasa, e ir haciéndolos más débiles cada vez hasta que se suelten, o bien con el bisturí realizar el corte lo más arriba posible, una vez extraídos ambos testículos, se aplica una solución llamada: Tetrabac en aerosol que es un antibiótico para evitar alguna infección, ya aplicada la solución se endereza la trampa y se libera al becerro.

