



UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE CHIHUAHUA
FACULTAD DE ZOOTECNIA Y ECOLOGIA

**Reporte de práctica: acondicionamiento de ganado para exportación en
Rancho Teseachic**

Medardo Becerra Magallanes 256293

Sistemas de producción de bovinos de carne

M.C. Alberto Flores Mariñelarena

Marzo, 2015

REPORTE DE PRÁCTICA

El día domingo 8 de Marzo, se realizó una práctica en el rancho de Teseachic, donde el propósito de la práctica fue de supervisar el ganado con finalidad de exportación.

Los puntos importantes para supervisar eran ciegos, abscesos, anahuates y garrapatas y se realizaron prácticas de manejo tales como: Descorne y castración de machos.



Supervisión:

- Se revisaron 16 becerros.
- Se curó 1 becerro de ciego.
- Se aplicó solución para garrapatas a todos
- Se trataron 8 becerros con anahuates.
- Se vieron solo algunos con tatuaje en las orejas.
- No se encontraron becerros con abscesos.

Prácticas de Manejo:

- Descorne: Se realizó a la mayoría, 11 becerros.
- Castración: Se realizó a 23 becerros.

Curación de ciegos: Esta práctica se realiza colocando a los becerros en una trampa y se les supervisaban los ojos, y a los que se le observaba como una nube se les aplicaba un polvo óptico de color morado llamado Sulfamixin para su curación.

Garrapatas: A todos los animales una vez en la trampa, se les aplicaba un garrapaticida llamado Bolfo es un aerosol, y se les aplicaba dentro de las orejas.



Anahuates: Se supervisaba que los animales que entraban a la trampa no trajeran papilomas principalmente en la parte frontal de la cabeza, a los que se les observaba se les extraían con manguera – poliducto, o con la navaja.

Tatuajes: Se supervisaba que los animales trajeran tatuaje en la oreja para su identificación.

Abscesos: Cuando los animales son colocados en la trampa, se le supervisa que no tengan bolas (abscesos) en la parte del cuello de los becerros.

Descorne: Una vez los animales colocados en la trampa y como ultima práctica, se descornaban los animales con las pinzas descornadoras y se aplicaba Tetrabac aerosol para prevenir infecciones.



Castración: Para la realización de esta práctica, una vez seleccionados los becerros, son colocados en una trampa que se inclina, una vez inclinado el animal se procede a hacer la castración, el primer paso es tomar el escroto y con una navaja o bisturí cortarlo, y externamente presionar para que salgan los testículos y queden expuestos para su extracción, una vez localizados se hacen movimientos rápidos presionando los conductos para de esta manera liberarlos de grasa, e ir haciéndolos más débiles cada vez hasta que se suelten, o bien con el bisturí realizar el corte lo más arriba posible, una vez extraídos ambos testículos, se le aplica una solución llamada: Tetrabac en aerosol que es un antibiótico para evitar alguna infección, ya aplicada la solución se endereza la trampa y se libera al becerro.

